

Medicamentos utilizados para el tratamiento del TDA/H

Nombre genérico	Nombre comercial*	Duración	Forma	Rango de dosis	Efectos secundarios comunes
Estimulantes					
Metilfenidato <i>Liberación inmediata</i>	Methylin Ritalin	3-4 horas	tabletas	5 mg 10 mg 20 mg	Disminución moderada del apetito, leve perturbación de sueño, pérdida transitoria de peso, irritabilidad, aparición de tics.
	Methylin Chewables	3-4 horas	tabletas	2.5 mg 5 mg 10 mg	
	Methylin Solution	3-4 horas	Solución líquida	5 mg/5ml 10 mg/5ml	
<i>Liberación prolongada</i>	Metadate ER Methylin ER	6-8 horas	tabletas	10 mg 20 mg	Disminución moderada del apetito, leve perturbación de sueño, pérdida transitoria de peso, irritabilidad, aparición de tics.
	Metadate CD	8-10 horas	cápsulas	10 mg 20 mg 30 mg	
	Ritalin LA	8-10 horas	cápsulas	10 mg 20 mg 30 mg 40 mg	
	Concerta	10-12 horas	tabletas	18 mg 27 mg 36 mg 54 mg	
<i>Parche transdérmico</i>	Daytrana	10-12 hours (9 horas por aplicación + hasta tres horas después de retirarse.)	Parche transdérmico	10 mg 15 mg 20mg 30mg	Disminución moderada del apetito, leve perturbación de sueño, pérdida transitoria de peso, irritabilidad, aparición de tics, irritación de piel.
Methylphenidate SR <i>Liberación sostenida</i>	Ritalin SR	4-8 horas	tabletas	20 mg	Disminución moderada del apetito, leve perturbación de sueño, pérdida transitoria de peso, irritabilidad, aparición de tics.
Dexmethylphenidate SR	Focalin	4-6 horas	tabletas	2.5 mg 5 mg 10 mg	Disminución moderada del apetito, leve perturbación de sueño, pérdida transitoria de peso, irritabilidad, aparición de tics.
<i>Liberación prolongada</i>	Focalin XR	6-10 horas	cápsulas	5 mg 10 mg 15 mg 20 mg 30 mg 40 mg	Disminución moderada del apetito, leve perturbación de sueño, pérdida transitoria de peso, irritabilidad, aparición de tics.

Dextroamphetamine <i>Acción corta</i>	Dexedrine	4-6 horas	tabletas	5 mg 10 mg	Disminución moderada del apetito, leve perturbación de sueño, pérdida transitoria de peso, irritabilidad, aparición de tics.
	ProCentra	4-6 horas	líquido	5 mg/5ml	
<i>Acción intermedia</i>	Dexedrine Spansule	6-8 horas	cápsulas	5 mg 10 mg 15 mg	Los mismos.
Lisdexamfetamine Dimesylate <i>Prodrug</i>	Vyvanse	10-12 horas	cápsulas	20 mg 50 mg 30 mg 60 mg 40 mg 70 mg	Disminución moderada del apetito, leve perturbación de sueño, pérdida transitoria de peso, irritabilidad, aparición de tics.
Sales mixtas de anfetamina <i>Acción intermedia</i>	Adderall	4-6 horas	tabletas	5 mg 7.5 mg 10 mg 12.5 mg 15 mg 20 mg 30 mg	Disminución moderada del apetito, leve perturbación de sueño, pérdida transitoria de peso, irritabilidad, aparición de tics.
<i>Liberación prolongada</i>	Adderall XR	8-12 horas	cápsulas	5 mg 10 mg 15 mg 20 mg 25 mg 30 mg	Disminución moderada del apetito, leve perturbación de sueño, pérdida transitoria de peso, irritabilidad, aparición de tics.
Medicamentos no estimulantes					
Atomoxetina <i>Liberación prolongada</i>	Strattera	24 horas	cápsulas	10 mg 18 mg 25 mg 40 mg 60 mg 80 mg 100 mg	Nerviosismo, problemas de sueño, fatiga, mal de estómago, mareo, sequedad de boca. En casos inusuales puede llevar daño hepático severo o a deseos de suicidio.
Antidepresivos atípicos					
Bupropion	Wellbutrin	4-5 horas	tabletas	75 mg 100 mg	Dificultad de sueño, dolor de cabeza, y en casos inusuales convulsiones.
	Wellbutrin SR	12 horas	tabletas	100 mg 150 mg 200 mg	
	Wellbutrin XL	24 horas	tabletas	150 mg 300 mg	
Antidepresivos tricíclicos					
Imipramina	Tofranil	8-24 horas	tabletas	10 mg 25 mg 50 mg	Nerviosismo, problemas de sueño, fatiga, mal de estómago, mareo, sequedad de boca, ritmo cardíaco acelerado, riesgo de arritmia cardíaca.

Desipramina	Norpramin	8-24 horas	tabletas	10 mg 25 mg 50 mg 75 mg 100 mg 150 mg	Ha sido asociado con muertes por problemas cardíacos. No se recomienda para niños.
Nortriptylina	Aventyl Pamelor	8-24 horas	cápsulas	10 mg 25 mg 50 mg 75 mg	Nerviosismo, problemas de sueño, fatiga, mal de estómago, mareo, sequedad de boca, ritmo cardíaco acelerado, riesgo de arritmia cardíaca..
Antihipertensos					
Clonidina	Catapres	4-6 horas	tabletas	0.1 mg 0.2 mg 0.3 mg	Fatiga, mareo, boca seca, aumento de actividad, irritabilidad, problemas de conducta, baja presión sanguínea. La discontinuación abrupta puede causar alta presión sanguínea.
		24 horas	Parche cutáneo	0.1 mg/24 hrs 0.2 mg/24 hrs 0.3 mg/24 hrs	
<i>Liberación prolongada</i>	Kapvay	12-24 horas	tabletas	0.1 mg 0.2 mg	
Guanfacina <i>Acción intermedia</i>	Tenex	6-8 horas	tabletas	1 mg 2 mg	Fatiga, mareo, boca seca, aumento de actividad, irritabilidad, problemas de conducta, baja presión sanguínea. La discontinuación abrupta puede causar alta presión sanguínea.
<i>Liberación prolongada</i>	Intuniv	12 - 24 horas	tabletas	1 mg 2 mg 3 mg 4 mg	
*Los nombres comerciales aquí mencionados son los utilizados en los Estados Unidos. Pueden variar por país.					